


Stop à la roulette russe pour les petits via l'injection covid



Par **Nicole Delépine**

À l'heure où l'extrême toxicité potentielle de certains lots de « vax » anticovid (la roulette russe) déferle sur tous les médias mondiaux dont certains mainstream, ce que nous — médecins et soignants — recevons de la direction générale de la santé (DGS) nous invite à vous parler une nouvelle fois des risques des injections anticovid chez les enfants, de plus parfaitement inutiles pour une maladie curable par de simples médicaments et n'ayant aucun risque léthal chez l'enfant tout particulièrement.

Courrier en date du jeudi 19 JANVIER 2023 alors que défilent des millions de personnes dans les rues de France pour s'opposer à la réforme des retraites et plus globalement s'opposer à la politique gouvernementale. « **[COVID-19] DGS-Urgent n°2023_03 : Ouverture de la campagne de vaccination aux enfants de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de Covid-19** »

On peut y lire : (extraits) :

« La Haute Autorité de santé recommande, dans son avis du 15 décembre 2022, d'ouvrir la vaccination aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de Covid-19 ainsi qu'aux enfants de cette même tranche d'âge vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée, avec le vaccin susmentionné.

La campagne de vaccination concerne les enfants âgés de 6 mois à 4 ans présentant au moins une comorbidité identifiée par la HAS.

La liste des comorbidités regroupe l'ensemble des comorbidités préalablement identifiées chez l'adulte comme pouvant comporter un risque de développer une forme grave de la maladie,

ainsi que certaines pathologies particulièrement à risque pour cette classe d'âge, dont la liste est la suivante :

- Les cardiopathies congénitales ;
- Les maladies hépatiques chroniques ;
- Les maladies cardiaques et respiratoires chroniques (y compris l'asthme sévère nécessitant un traitement continu) ;
- Les maladies neurologiques ;
- L'immunodéficience primitive ou induite par médicaments ;
- L'obésité ;
- Le diabète ;
- Les hémopathies malignes ;
- La drépanocytose ;
- La trisomie 21.

À ces pathologies peuvent s'ajouter des situations où, au cas par cas, sur la base d'une évaluation stricte du rapport bénéfice/risque individuel, les médecins spécialistes d'organes et de maladies rares peuvent proposer la vaccination à des enfants du fait d'une vulnérabilité conférant un risque majeur de formes graves de Covid-19.

La campagne de vaccination concerne également les enfants âgés de 6 mois à 4 ans vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée dans le cadre de **la stratégie de cocooning**.

La primo-vaccination des enfants âgés de 6 mois à 4 ans comprend l'injection de 3 doses de la forme du vaccin spécifique à cette tranche d'âge (3 µg/dose). Les deux premières doses doivent être administrées à 21 jours d'intervalle. La troisième injection doit être réalisée 8 semaines après la deuxième.

Même en cas d'infection au Covid-19 survenue avant le début du schéma vaccinal ou entre les différentes injections (exemple : infection survenant avant la 1^{re} injection, ou entre la 1^{re} et la 2^e injection ou entre la 2^e et la 3^e injection), **les trois doses devront in fine être réalisées, pour garantir une protection optimale.**

En cas d'infection au Covid-19, un délai de 3 mois devra être respecté entre l'infection et l'injection. Il est important de compléter un schéma vaccinal entamé. En effet, la protection apportée par seulement deux doses pour cette classe d'âge est insuffisante. La protection est optimale après la troisième injection.

Il est par ailleurs possible de recevoir un autre vaccin du calendrier vaccinal concomitamment au vaccin COMIRNATY 6 mois 4 ans. Si ceux-ci ne sont pas administrés le même jour, aucun délai spécifique n'est à respecter entre les deux injections.

Les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'État (IDE), notamment les IDE puéricultrices et puériculteurs, qui ont l'habitude de vacciner les enfants de cette tranche d'âge, sont autorisés à leur administrer le vaccin **dès lors que celui-ci a été prescrit par un médecin.**

Comme pour la vaccination des autres publics mineurs, la vaccination des enfants âgés de 6 mois à 4 ans nécessite l'autorisation des deux parents, sauf impossibilité pour l'un des deux parents de recueillir l'accord de l'autre parent. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'enfant soit accompagné par un de ses parents. La personne qui l'accompagne doit pouvoir établir qu'elle détient l'accord parental et présenter un formulaire d'autorisation parentale dûment signé par les deux parents.

Le formulaire d'autorisation parentale est disponible [ici](#), et devra être remis au personnel dans le lieu de vaccination. Les formulaires d'autorisation parentale sont à conserver durant 3 mois suivant la vaccination [1](#).

La vaccination des enfants de 6 mois à 4 ans les plus à risque pourra débuter dès la semaine du 16 janvier 2023 dans les établissements de santé et services concernés. Afin de vacciner les autres enfants prioritaires, une offre de vaccination en ville est également proposée. À compter du lundi 23 janvier 2023, les officines pourront commander des flacons du vaccin Comirnaty® pédiatrique 6 mois – 4 ans (Pfizer-BioNTech) pour les médecins, sages-femmes et infirmiers diplômés d'État (IDE) qui leur en font la demande directement sur [l'outil de commande de Santé publique France](#), en sélectionnant le libellé suivant : « VACCIN COVID 19 PFIZER PED 6M4A ».

COMMENT EN 2023 ENCORE INJECTER DES ENFANTS AVEC CETTE SUBSTANCE EXPÉRIMENTALE INEFFICACE ET DANGEREUSE ?

Rappelons une fois de plus les données de santé publique France que les enfants risquent beaucoup moins du Covid que de la grippe

LES ENFANTS ONT UN RISQUE ZERO DU COVID POURQUOI LES INJECTER ?

TAUX DE LÉTALITÉ PAR INFECTION DE LA GRIPPE ET DE LA COVID-19 SELON L'ÂGE

COVID-19		GRIPPE	
0-19 ans	0,001 %	0-4 ans	0,007 %
20-29 ans	0,01 %	5-17 ans	0,004 %
30-39 ans	0,02 %	18-49 ans	0,02 %
40-49 ans	0,05 %		
50-59 ans	0,2 %	50-64 ans	0,06 %
60-69 ans	0,8 %		

On nous invite à injecter les enfants de six mois à quatre ans « à risque » parce que porteurs de certaines pathologies. Mais ces petits ont souvent une immunité précaire qui rend les vaccins généralement inefficaces alors que les médicaments tels l'ivermectine sans toxicité et l'hydroxychloroquine associée aux macrolides suffiraient à la guérir. Et il est maintenant bien démontré que les injections géniques anticovid baissent l'immunité et de plus en plus avec la multiplication des doses.

Comment imaginer que des médecins et sur leurs ordres des sages femmes et infirmiers vont prendre la lourde responsabilité de risquer la vie ou la qualité de vie d'enfants pour une maladie beaucoup moins dangereuse que la grippe pour eux et de plus presque disparue en Europe ?

Comment faire comprendre aux prescripteurs et injecteurs leur immense responsabilité par la confiance que leur font les familles et les dangers qu'ils font courir à leurs petits patients ?

LES TOXICITÉS SE MULTIPLIENT AVEC LE RECUL

Dernières nouvelles du VAERS au 30 décembre 2022 USA : 61 000 évènements indésirables et complications chez les enfants et bébés (6 mois — 17 ans) rapportés par l'agence dépendant de la FDA dont 179 enfants décédés à la suite des injections géniques

VAERS COVID VACCINE REPORTS IN CHILDREN 6 MONTHS-17 YRS	TOTAL DECEMBER 30th 2022
DEATHS	179
INJURIES REPORTED	61,301
HOSPITALISED	4,633
MYOCARDITIS	1,435
PERMANENTLY DISABLED	562
LIFE THREATENING	696
SEVERE ALLERGIC REACTIONS	1,647
THROMBOCYTOPENIA	262
BELL'S PALSY	234
CEREBRAL HAEMORRHAGE	46
GUILLAIN BARRÉ/PARALYSIS	107

CHILD COVID VACCINE INJURIES UK-TELEGRAM

Selon le sénateur Ron Johnson



14 janv.

« The VAERS data for children aged 0-17 shows 179 deaths, 575 permanent disabilities and 61,983 adverse events. How many more will it take for

@CDCgov

to admit the truth? » quand le gouvernement américain va-t-il admettre la vérité ?

VAERS
(Vaccine Adverse Effect Reporting System)

for all
COVID VACCINES
In children age 0-17.
As of Jan. 13, 2023. Worldwide.

total number of child **deaths**: **179**

child deaths on **days 0, 1 or 2**: **47**

total child **permanent disabilities**: **575**

total child **hospitalizations**: **4,672**

total **adverse events** in children: **61,983**

CDC. VAERS launched on July 1, 1990.




En UE on connaissait clairement le danger dès janvier 2022

Akir @outoff568 · 31 janv. 2022

Voici la dernière mise à jour des effets secondaires par adreports **Eudravigilance Europe**.

Ici pour Pfizer on constate une hausse de 161.779 nouveaux cas pour un total de 736.206 dont 57.541 'Cardiac Disorders' dont 1.621 **enfants** de 12 à 17 ans, avec un total de 2.554 morts



Depuis le début de la vaccination, en Europe,
ce sont **241** garçons et filles, âgés de 0 à 17 ans
qui sont décédés des suites de la vaccination
contre la maladie dite Covid-19.

142 sont morts d'une injection Pfizer
29 sont morts d'une injection Moderna
25 sont morts d'une injection Astra-Zeneca
25 sont morts d'une injection Janssen

Depuis le 1^{er} janvier 2022, **11604** déclarations d'effets
secondaires ont été enregistrées.

Luxembourg, le 30 janvier 2022

Source: <https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages>

www.efvv.eu

EN UE, EN JUILLET 2022

Des décès chez les enfants après injection générique CONTINUENT à être signalés. Comment la Commission européenne en oct 2022 et à sa suite la HAS peuvent-elles oser recommander ces injections possiblement létales chez de jeunes enfants qui ne risquent rien du covid (même les enfants présentant une comorbidité sont très peu à avoir été véritablement impactés par le covid, moins de dix morts par an).

@El_Dic_TatoR 25 juil. 2022

Plus de 37 000 effets secondaires d'enfants en Europe après vaccination E.M.A
(EudraVigilance)

Moderna 2 328

Pfizer 33 311

AstraZeneca 1 240

J&J 187

Le reste des effets secondaires des enfants est volontairement caché dans la catégorie « Âge non spécifié » : 106 304

EUDRAVIGILANCE REPORTS OF INJURIES AFTER COVID-19 VACCINE IN CHILDREN 1 MONTH-17 YEARS 24/07/2022

	ADVERSE EVENTS	ADVERSE EVENTS UNSPECIFIED AGE
MODERNA	2,328	11,940
PFIZER	33,311	56,760
ASTRAZENECA	1,240	33,194
J&J	187	4,410
 EUROPEAN MEDICINES AGENCY SCIENCE MEDICINES HEALTH	TOTAL 37,066	TOTAL 106,304

CHILD COVID VACCINE INJURIES UK-TELEGRAM

Latest **EUDRAVIGILANCE (EMA)** data of adverse events in children aged 1 month-17 years as of 24/07/22



Nombre d'enfants âgés de 0 à 17 ans décédés en Europe des injections anti-covid19 depuis le 1er janvier 2022.

6 sont décédés après avoir été injectés à l'aide du Janssen
 5 sont décédés après avoir été injectés à l'aide de l'Astra Zeneca
 30 sont décédés après avoir été injectés à l'aide du Moderna
 117 sont décédés après avoir été injectés à l'aide du Pfizer

Nombre de personnes décédées dont l'âge n'a pas été mentionné dans les rapports:

151 personnes sont décédées du produit Janssen
 128 personnes sont décédées du produit Astra Zeneca
 101 personnes sont décédées du produit Moderna
 136 personnes sont décédées du produit Pfizer

Luxembourg, le 07 novembre 2022.

Source : <https://www.adrreport.eu>



Et les rapports s'accumulent s'ajoutant aux vécus quotidiens de nombreuses personnes : des parents dont les jeunes enfants ou adolescents décèdent lors d'un match de foot ou d'une compétition de boxe... Les sportifs du monde entier sont atterrés des crises cardiaques et/ou morts sur le terrain. Certains demandent des enquêtes afin que la tragédie s'arrête.

On pourrait multiplier les témoignages et les analyses et de nombreux livres sont en cours de rédaction, accumulant les observations et les déclarations en justice.

Mais nous n'avons pas le temps d'attendre. Ces injections doivent cesser MAINTENANT.



Le Dr Malone explique comment la myocardite tue des enfants ou des athlètes de haut niveau et il confirme que les myocardites «légères» n'existent pas.

Une myocardite est TOUJOURS dangereuse. pic.twitter.com/G1wMN9zHJj

— 🍓 Sined Warrior 🐭 🍓 (@SinedWarrior) [September 28, 2022](#)

"Les **enfants** risquent d'être blessés...Les rapports d'autopsies apparaissent...Les **myocardites** légères...n'existe[nt] pas, une myocardite provoque des cicatrices qui mènent à des défauts de conduction, notamment lorsque l'enfant va grandir"



la vaccination ne présente **Aucun** bénéfice pour les enfants qui ne risquent pas de mourir du Covid

1:48 32,9 k vues

LeCl@irvoyant 🗣️ 🧠 ➡️ 🦋 @leclairvoyant6 · 2h

Le Dr Peter McCullough nous montre qu'avant le COVID, la **myocardite** courait environ 4 cas par million. Après le 🦠 la **myocardite** est maintenant de 25 000 par million et 📈 Les MSM poussent toujours le changement climatique comme cause de 📈



Ou encore ce médecin ému aux larmes

CB Laurence @CBLaurencez · 12 janv.

Kirk Milhoan ému aux larmes face aux effets dévastateurs de l'injection
#Covid19

Kirk Milhoan Dr en physiologie et pharmacologie cardiovasculaires
spécialisé dans l'inflammation du myocarde.

#EffetsSecondairesVaccins #myocardite #Pfizer #vaccins



@ONG_AHSI

17 janv. #STOPvaccinovid19

Pr Abdullah Al Abdulgader, éminent cardiologue, appelle toutes les nations à stopper les injections à ARNm, de toute urgence. #Cardio #myocardite #AVC

[Alliance Humaine Santé Internationale](#)






Alors écoutons pour une fois la pub du gouvernement sur nos antennes (payé par nos impôts) : « **un geste bien répété finit toujours par payer** ».

Prenons-les au mot et répétons encore et encore que **les injections à ARN messenger doivent être stoppées, interdites dès maintenant et singulièrement chez les enfants** ².

Participons tous au sauvetage de l'humanité, car si trop d'enfants ou de jeunes adultes sont injectés, la baisse de la fertilité déjà constatée ne fera que s'aggraver ³.

En France




Comme en Italie :

More Deaths, Fewer Births


The Covid pandemic has made Italy's demographic crisis much worse

■ Births ■ Deaths




Note: Provisional data for 2020
Source: Istat

Mais aussi en Hongrie :



Ou au Japon :



Informez par tous les moyens (conversations amicales, familiales, tracts et pourquoi pas réseaux sociaux, etc.) du terrible de danger de ces pseudovaccins. Chacun, même les pluri-injectés, s'il est sollicité par un petit caillou dans son déni pourra constater la véracité de nos propos, chez un ami, un proche, etc. perte de poids rapide, perte d'appétit complète et douleurs du dos et comme par hasard encore un cancer du pancréas... Ou une rechute brutale de cancer du sein en rémission depuis dix ans, ou encore une régression psychique rapide d'un parent qui perd son chemin et ne reconnaît plus ses proches.

ET NE LAISSEZ PAS INJECTER LES PETITS ! C'EST VOTRE DEVOIR D'HUMAIN DE PROTÉGER NOTRE AVENIR.

Aucune raison d'injecter les enfants contre le covid

Pour lui éviter des complications?
Le risque chez l'enfant sont quasi nuls

Une deuxième injection parce que la première n'est pas efficace?
La 2^{ème} est tout aussi inefficace

Un puis deux rappels parce que les inj précédentes ont été inefficaces?
Les rappels sont tout aussi inefficaces

Pour protéger papy et mamy?
Les enfants ne contaminent pas les adultes et les injections n'empêchent pas les transmissions

Prévoir dix injections car Von der Leyen les a commandées pour le plus grand bonheur des actionnaires de Pfizer

1 Pourquoi seulement trois mois alors que la règle était de garder les dossiers médicaux adultes trente ans et enfants indéfiniment dans les services.... Tout saute ?

[2 Refuser la marche forcée pour injecter petits et femmes enceintes par un médicament génique expérimental — Nouveau Monde \(nouveau-monde.ca\)](#)

[3 L'Humanité est-elle condamnée à la disparition ? — Docteur Nicole Delépine \(nicoledelepine.fr\)](#)



PDF A4



Imprimer